

Le Noisetier commun

(*Corylus avellana*)

- **Famille** : Bétulacées
- **Origine** : Europe & Asie occidentale
- **Floraison** : janvier à mars
- **Plantation** (racines nues) : octobre à mars
- **Préférences** : peu exigeant, apprécie un sol frais et léger, peu acide ou neutre. Se plait au soleil et à la mi-ombre. Très rustique.
- **Milieus** : bois de feuillus, lisières, haies, jardins.
- Présent presque partout en France jusqu'à 1700 m.

Le Noisetier ou Coudrier, est un arbuste monoïque : il possède à la fois des fleurs mâles et femelles sur un même pied. Buissonnant, il fait partie des espèces pionnières, premières à coloniser les zones dénudées et sablonneuses. Ses racines permettant de maintenir le sol.

Autostérile, il requiert une fécondation croisée effectuée par le vent. Sa dispersion est assurée par les rongeurs, oiseaux ...

Il ne produit pas de nectar mais ses fleurs mâles (chatons) sont très pollinifères (notées 5/5). Sa floraison précoce est très appréciée des pollinisateurs en début de saison. Il est également la plante hôte de nombreux papillons et champignons.



Les noisettes sont groupées en trochets (2-3 fruits)



Les noisettes sont groupées en «trochets» (2-3 fruits)



Feuilles caduques, alternes, ovales et larges, pointues au sommet, dentées, courtement pétiolées, vert sombre dessus, plus claires & duveteuses dessous

Fleurs femelles discrètes, dans bourgeon écaillé. 2 longs styles rouges, le long des rameaux



6-8 étamines

Fleurs mâles : chatons jaunâtres (5-10 cm), à la base des rameaux ou à l'aisselle des feuilles, cylindriques, pendants, apparaissant avant les feuilles

Tiges nombreuses et dressées, Rameaux flexibles et pubescents
Hauteur : 2 à 8 m.



Réseau Biodiversité
pour les Abeilles